

Kennistoets Multiple Sclerose

+ juiste antwoorden

MS is de meest frequente oorzaak van invaliditeit onder jong volwassenen in de westerse wereld.

Antwoord: juist.

Wat is de prevalentie van MS in Nederland?

A 1 op de 100000;

B 10 op de 100000;

C 100 op de 100000.

Antwoord: 100 op de 100000.

Wat is de man:vrouw verhouding?

A 1:2,5 ;

B 1:1 ;

C 1:5

Antwoord: 1:2,5

Bij hoeveel procent van de MS-patiënten is de ziekte gestart tussen 15 en 50 levensjaar?

A 70% ;

B 80% ;

C 90%

Antwoord: 90%

Welke vormen van MS zijn er?

Antwoord: remitting relapsing MS, secundair progressieve MS en primair progressieve MS.

MS is middels diagnostiek met zekerheid vast te stellen.

Antwoord: onjuist, MS is een klinische waarschijnlijkheidsdiagnose. Er is geen diagnostische test die volledige zekerheid geeft.

Wat is het doel van medicamenteuze behandeling?

A curatie ;

B vermindering van de symptomen ;

C vermindering van de relapsfrequentie ;

D vermindering van progressie ;

E sneller herstel van relapsperiode

(meerdere antwoorden mogelijk).

Antwoord: B, C, D en E.

De vermindering van arbeidsparticipatie bij mensen met MS is ongeveer de helft.

Antwoord: onjuist, de vermindering van de arbeidsparticipatie is oplopend tot meer dan 80%.

Van de totale WIA aanvragen in 2009 was MS in 1,2% van de gevallen de primaire diagnose.

Gemiddeld was 48% van het totaal aantal aanvragen uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt, 14% volledig en duurzaam. Voor de aanvragen betreffende mensen met MS waren deze percentages:

A lager, namelijk 40% en 12%

B hoger, namelijk 55% en 24%

C hoger, namelijk 67% en 38%

Antwoord: C

Wat zijn belangrijke gevolgen van MS, naast de primaire klachten?

A Vermoeidheid

B Conditieverlies

C psychosociale problematiek

(meerdere antwoorden mogelijk)

Antwoord: allemaal.

Multidisciplinaire revalidatie heeft een positief effect op het activiteiten niveau en participatie niveau. Dit geldt niet voor de vermoeidheid.

Antwoord: onjuist. Dit geldt ook voor vermoeidheid.